

PROTOCOLO SANITARIO

OVEYA XALDA (RECOMENDACIONES)



DESPARASITACION:

Dependiendo de la carga ganadera y la rotación de las parcelas

Enero: Endex ovino®

Abril: Albendazol

Julio: Endex ovino®

Octubre: Ivomec ovino®

CORDEROS:

En la primera semana de vida: 1 cc de Vigantol por boca. 1 cc de Selenio.

BASQUILLA - Vacunación enterotoxemia:

Miloxan cada 6 meses. Conviene que una de las vacunaciones sea en Noviembre-Diciembre con el fin de aumentar defensas en la paridera. La primera vez que se vacuna hay que revacunar a las cuatro semanas de la primera dosis. Sería conveniente que en los corderos la primera vacunación no fuera más tarde de los 4 meses de vida. No hay problema por vacunarlos con el resto del rebaño, aunque no hayan pasado esos seis meses.

PEDERO:

Tener los animales en seco, arreglar pezuñas, pediluvios; TODO EL REBAÑO.

Dejar descansar la parcela donde estuvieron los animales 3 meses, mejor segarla

-Tilosina o Penicilina estreptomycinica (sin dexa)

ESQUILEO: (Aprovechar para hacer arreglo de pezuñas) (meses aproximados según zona)

Un esquileo (mayo): Esquilar también paridera invierno.

Dos esquileos (abril-octubre): 1º- Esquilar también paridera invierno.

2º- Esquilar también paridera verano.

FINCAS: Rotar las parcelas y si es posible que permanezcan en reposo 3 meses y sería conveniente realizar alguna siega. PIEDRA DE SAL + MINERALES, A LIBRE DISPOSICION.